



**LYSEKILS
KOMMUN**

Bildningsnämnden

Hjälpreda för infekterade barn i förskola/skola

Impetigo/svinkoppor

Yttrar sig oftast som sår vid näsa/mun. Är mycket smittsamt! Var noga med handhygien och använd inte samma handduk.

Behandling: tvätta med tvål och vatten, Klorhexidinlösning (2 mg./ml.) eller Alsollösning tills blåsorna är torra, vilket kan ta flera dagar. Vid utbredda svinkoppor, kan tablettbehandling med antibiotika behövas.

Barnen är då smittfria efter 2-3 dagar.

Små barn bör vara hemma tills de är smittfria.

Mollusker

Behöver vanligtvis inte behandlas. Smittar inte.

Magsjuka

Inga barn med kräkning eller vattentunna diarré skall vistas i skolan. Speciellt försiktighet efter utlandsvistelse. Var noga med handhygien. Viktigt att ge extra dryck samt uppmärksamma barnets allmäntillstånd. Lös avföring under längre tid kan bero på andra orsaker, rådfråga skolsköterska/sjukvårdsupplysningen eller vårcentral.

Barnet skall vara hemma två ”magfriska” dagar (48 timmar efter sista kräkning/diarré).

Maskinfektioner

Orsakas ofta av springmask. Receptfria läkemedel finns på apoteket. Hela familjen bör behandlas. Barnet kan visas i skolan.

Löss

Huvudlöss kan finnas i både kort och långt hår och även om vi är noggranna med vår hygien. Är det konstaterat att barnet har löss får barnet inte gå till skolan innan det behandlas. På apoteket finns receptfria preparat som rekommenderas. Observera att ENDAST det barn som har löss skall behandlas. Viktigt att informera skolan och kamraters föräldrar om ni upptäckt löss. Kontrollera regelbundet barnets hår med en s.k luskam. Har flera barn löss i skolan, finkammar alla föräldrar sitt/sina barn en period. Då hittar vi eventuella löss och tillsammans kan vi få stopp på problemet.

Barnet kan vara i skolan direkt efter behandling.

Ögoninfektioner

Röda irriterade ögon i samband med förkylning orsakas vanligen av virus och behöver inte behandlas.

Om ögonen är smetiga, tvätta med ljummet vatten flera gånger om dagen i 4-5 dagar. Om detta inte hjälper behöver barnet troligen behandlas med ögonsalva efter kontakt med vårdcentralen.

Barnet är efter behandling vanligtvis smittfri efter ca. 2-3 dygn och kan återgå till skolan.

Feber

Barnet bör vara hemma minst en feberfri dag, men viktigast är allmäntillståndet.

Barnen skall orka med skolans normala verksamhet.

Se även www.1177.se (sjukvårdsrådgivningen).

Per Möllborg, skol-/barnläkare
Catarina Windahl-Bergman, skolsköterska

Skolhälsovården
090818